



# ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЭПИДЕМИОЛОГ

123181, Москва, 1-й Пехотный пер., д. 6  
[bogdan@gcgie.ru](mailto:bogdan@gcgie.ru)

тел./факс (499) 190 4861

13 04 2021 40/051

Руководителям территориальных  
органов  
Главным врачам ЦГиЭ  
Начальникам МСЧ/ЦМСЧ  
Главным врачам клинических  
больниц  
Директорам медицинских центров  
ФМБА России

Уважаемые коллеги!

Ситуация, связанная с распространением в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19, продолжает оставаться напряженной. Положение усугубляется регистрацией новых штаммов вируса SARS – CoV – 2 в странах Европы, Азии, а также Южной Америки и Австралии.

По сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаруженные новые штаммы коронавируса имеют высокую скорость распространения по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами, а риск повторного завоза вируса и возобновления инфекции сохраняется в каждой стране.

На территории Российской Федерации официально подтверждено появление новых штаммов коронавируса — британского и южноафриканского. Риск завоза новых штаммов возрос с увеличением туристических поездок граждан в зарубежные страны, в том числе в Турцию.

С целью профилактики возникновения случаев заболевания коронавирусной инфекции, вызываемой новыми штаммами вируса SARS – CoV – 2, в организованных коллективах, необходимо продолжать неукоснительно придерживаться общих принципов организации работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, а именно:

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

2. Использование сотрудниками средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа.

3. Регулярная обработка рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе).

4. Запрещение входа в подразделения лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между сотрудниками путем соблюдения принципов социального дистанцирования не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

6. Ограничение перемещения сотрудников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию, перемещение внутри организации.

7. Запрет приема пищи на рабочих местах.

8. Прием пищи в специально отведенной комнате с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

9. Проведение влажной уборки всех помещений и мест общего пользования - 2 раза в день, туалетных комнат и контактных поверхностей – каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.


10. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа, дезинфекция воздушной среды с использованием облучателей – рециркуляторов закрытого (в присутствии людей) и открытого (в отсутствии людей) типов.

Следует помнить, что эффективным и самым надёжным средством профилактики по-прежнему остаётся своевременно сделанная прививка. Необходимо в приоритетном порядке прививать тех, кто подвержен наибольшему риску заражения (работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров). Кроме того, вакцинации подлежат люди, для которых заражение коронавирусной инфекцией исключительно опасно - лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

При возникновении случаев заболевания среди лиц, в том числе ранее переболевших COVID-19, а также привитых против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS – CoV-2, необходимо соблюдать требования

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в части изоляции больных и контактных с ним лиц, проведению дезинфекционных мероприятий.

Также, требует усиления просветительная работа среди сотрудников, отправляющихся на отдых в зарубежные страны, в части своевременного информирования о существующих рисках инфекционных заболеваний.



С. А. Богдан