



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЭПИДЕМИОЛОГ

123181, Москва, 1-й Пехотный пер., д. 6
bogdan@gcgie.ru

тел./факс (499) 190 4861

19.03.2021 № 40/036

Директору
ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи"
Минздрава России
Гинцбургу А.Л.

Уважаемый Александр Леонидович!

При проведении массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения, подлежащего обслуживанию ФМБА России, с использованием лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак», разработанного в Вашем исследовательском центре, возникает ряд вопросов, требующие Вашего участия.

В связи с изложенным, прошу разъяснить следующие вопросы:

1. Какая тактика проведения вакцинации при нарушении интервала введения II компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак».
2. Какая тактика (схема и сроки) проведения вакцинации людей, препаратом «Гам-КОВИД-Вак» после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
3. Является ли наличие высокого титра антител к новой коронавирусной инфекции, прямым противопоказанием для проведения вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак».
4. Есть ли необходимость в проведении анализа на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (сроки и методы) после проведения вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак».
5. Нужно ли проводить повторную вакцинацию, в случае отсутствия антител к белку S вируса SARS-CoV-2 после проведения первичной вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

Пользуясь случаем, выражаю Вам, уважаемый Александр Леонидович, искреннюю признательность за Ваш многолетний труд в сфере защиты населения от инфекционных заболеваний.

С.А. Богдан